

40 COMPRIMIDOS MASTICABLES

1. IDENTIFICACIÓN, COMPOSICIÓN Y FINALIDAD

1.1 DESCRIPCIÓN E INDICACIONES DE USO

Almanatur® es un producto sanitario compuesto por alginato de magnesio, carbonato de calcio, Mucosave® plus HC y bicarbonato de potasio. **Almanatur®** está indicado para el tratamiento sintomático del reflujo gastroesofágico y los síntomas relacionados, como la pirosis, la esofagitis, la regurgitación ácida y el ardor de estómago.

Almanatur® también está indicado para el tratamiento del reflujo laringofaríngeo y los síntomas relacionados, como el cambio de voz, la tos seca, la sensación de cuerpo extraño en la garganta, los trastornos de la deglución y la irritación de las vías respiratorias superiores.

1.2 CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

No tome **Almanatur®** en caso de hipersensibilidad conocida a sus componentes, perforación u obstrucción gastrointestinal.

No tome **Almanatur®** en caso de estreñimiento o diarrea crónicos, enfermedad renal o insuficiencia cardíaca crónica.

No administre este producto sanitario a niños menores de 12 años, a menos que el médico indique lo contrario.

1.3 COMPOSICIÓN

Un comprimido masticable de 1,3 g contiene: 250 mg de alginato de magnesio, 80 mg de carbonato de calcio, 60 mg de Mucosave® plus HC (*Opuntia ficus indica* L., *Olea europaea* L., maltodextrinas), 40 mg de bicarbonato de potasio. Excipientes: hidróxido de magnesio, isomalt, sucralosa, aroma de menta, sabor refrescante, sabor enmascarante, mono y diglicéridos de ácidos grasos, Carbopol® 974P NF, celulosa microcristalina, estearato de magnesio, dióxido de silicio, carboximetilcelulosa de sodio.

1.4 MECANISMO DE ACCIÓN

Almanatur® es un producto sanitario que realiza las siguientes acciones:

- Efecto de barrera, con formación de la denominada "balsa flotante" para evitar el ascenso del contenido gástrico a lo largo del esófago. El carbonato en contacto con el ácido clorhídrico presente en el estómago libera CO₂.

El dióxido de carbono absorbido en el gel de alginato lo empuja hacia arriba, lo que favorece su flotación sobre el contenido del estómago y el consiguiente efecto de barrera. Este mecanismo evita la vuelta del ácido y los alimentos al tracto esofágico y evita la exposición esofágica al ácido.

- Alcalinización, útil para amortiguar la acidez gástrica excesiva.
- Protección de la mucosa gastroesofágica y laringofaríngea.

Las propiedades mucoadhesivas de **Almanatur®** reducen los síntomas (quemazón, dolor) y promueven la curación a través de un mecanismo mucoadhesivo físico/mecánico.

1.5 PRESENTACIÓN

Una caja de 40 comprimidos masticables de 1,3 g (4 blísters x 10)

2. MÉTODO DE USO

Coloque el comprimido directamente en la boca; el comprimido se puede masticar o disolver (se puede romper y masticar un poco cada vez); a continuación, se puede beber algo de agua sin gas. **Atención:** no tragar el comprimido entero.

3. DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Adultos y adolescentes a partir de 12 años: 2 comprimidos masticables después de las comidas y 2 comprimidos por la noche antes de acostarse. Se pueden administrar 2 comprimidos otra vez antes de acostarse o durante el día, de acuerdo con la recomendación del médico. No use **Almanatur®** durante más de 30 días consecutivos; si los síntomas persisten, consulte a un médico.

3.1 INTERACCIONES

El producto sanitario puede retrasar o reducir la absorción de fármacos administrados de forma concomitante. Por lo tanto, consulte a un médico antes de empezar a usar un producto como **Almanatur®**, especialmente cuando esté tomando píldoras anticonceptivas o fármacos vitales. El producto puede no estar asociado a ninguna contraindicación con respecto a productos farmacológicos, como el omeprazol, la cimetidina o la cisaprida; sin embargo, se recomienda consultar a un médico o farmacéutico antes de empezar a tomar **Almanatur®**.

3.2 EFECTOS SECUNDARIOS INDESEABLES

Aparte de los casos de intolerancia individual, a las dosis necesarias para lograr un efecto terapéutico, no se ha notificado hasta la fecha la aparición de efectos secundarios indeseables, excepto náuseas o estreñimiento leves y transitorios.

4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto perfectamente cerrado, en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de luz y calor. La fecha de caducidad se indica en el embalaje y en el blíster, y se refiere al producto en su embalaje intacto y conservado según se indica. No use **Almanatur**[®] después de esta fecha o si el embalaje está abierto o dañado.

5. ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños. No utilice el producto si el embalaje original no está perfectamente intacto. Si está tomando otros medicamentos, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar el producto. Durante el embarazo y la lactancia, consulte a su médico antes de tomar el producto. No exceda la dosis recomendada, ya que cantidades más altas pueden causar la aparición de estreñimiento o diarrea transitoria. Compruebe la fecha de caducidad que figura en el envase antes de utilizar **Almanatur**[®] y no lo utilice después de la fecha de caducidad.

6. ELIMINACIÓN

Los productos sanitarios no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y productos sanitarios que no necesite en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda

pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los productos sanitarios que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.



Fabricante:

Pharma Line S.r.l.
Via Bertani 2,
20154 Milan - Italia

Distribuidor en España:

Almirall, S.A.
General Mitre, 151
08022 - Barcelona

Mucosave[®] es una marca registrada de Bionap S.r.l.

Almanatur[®] es una marca registrada de Almirall, S.A.

Significado de los símbolos usados:

	Nombre y dirección del fabricante		Mantener por entre los 0° y 25°C
	Marcado CE		Punto de reciclaje
	Producto sanitario de un solo uso		Lote
	Consulte las instrucciones de uso		Fecha de caducidad
	Mantener fuera de la luz solar		Mantener fuera del alcance de los niños
	Mantener en lugar seco		